

Release note PHP 7.3.2

Release-dato: Onsdag d.11 juni 2025

Patientliste for diabetes patienter, som også har IHS

I toppen af patientlisten for diabetes, kan man nu tilgå en link til en patientliste, der samler de patienter i praksis, som både har diabetes og IHS. Listen kan også tilgås fra "Oversigt" siden.

Patienter, som både har diabetes og en IHS diagnose fremgår også af den almindelige diabetes liste (men ikke af patientlisten over IHS patienter, da diabetes patienter her er sorteret fra og kun vises i diabetes). Men hvis praksis ønsker at have speciel fokus på de patienter, som både har diabetes og IHS har de været svære at fremsøge i lister og grafer. De er derfor samlet i en visning.

Diabetes

Diabetes patienter med IHS diagnose kan fremsøges i en separat liste her.

Patientliste**Overblik**

Aktuelle ▼ **Patienter: 42** ?

Diabetes og OzempicMore ▼

Navn	Cpr	0131/0132 ydelse	HbA1c	Blodtryk	LDL	eGFR	Albumin kreatinin	SCORE2 Diabetes	ACE/ A2A	Metformin	SGLT2	GLP1	Forløbsplan udfyldt	Diabetes Årskontrol	Årskontrol	Følges ikke i praksis	Patient ikke relevant
Alexander Flemming	060881-9999		54	133/68	2,8	90	29	8					17-03-2025			☐	☐
Brita T. Berggren	150981-9996		54	131/82	1,9	88	12	5					17-03-2025		14-03-2017	☐	☐

Lægefaglige oversigter

**Triple Whammy**
Gå til patientliste

**Nedsat Nyrefunktion**
Gå til patientliste

**Diabetes og Ozempic**
Gå til patientliste

**Diabetes og IHS**
Gå til patientliste

**Vaccinationer**
Gå til patientliste



Ydemnummer 999999 Maja Oversigt OK22 Målopfylde Support

Diabetes og IHS

Patienter: 14 ?

Mere ▼

Information

Her ses alle patienter, som både har diabetes og IHS (ICPC: K74-75 eller K76). Diagnosen for diabetes og IHS må gerne være > 3 år gammel.

	Hjemmemålt blodtryk	LDL	HbA1c	eGFR	eGFR fald	Albumin kreatinin	ACE/ A2A	SGLT2	GLP1	ASA
	6,3 !	54	90	51						
	!	53	90							
Holger T. Hansen	230262-9995	2,6	44	221						
Hilda T. Hansen	220262-9996	148/82	5,2 !	62	21	117				

ICPC koder for Forværring i KOL anvendes til udregning af exacerbationer:

Når en KOL patient har fået en ICPC diagnose for enten R81- Lungebetændelse eller R78 – Akut Bronkit, anvender vi det i formularen til at udregne antal exacerbationer indenfor de sidste 12 måneder. Vi udregner altid antal exacerbationer, hvis der er data til rådighed, som kan indgå i en beregning, inden vi forudfylder med en værdi fra laboratoriekortet (MCS88022).

I beregning af antal exacerbationer indgår derfor 3 faktorer aktuelt, som alle skal være sket indenfor de sidste 12 mdr.

1. Hvis patienten har fået antibiotika, hvor der i indikationsteksten står ”lungebetændelse/forværring i KOL/pneumoni”
2. Hvis pt. enten har fået en kur med tabl. Prednisolon a´ 25/37,5 mg i 3, 5 eller 7 dage
3. Hvis pt. har fået også en diagnose for lungebetændelse eller akut bronkit i beregningen.

Hvis en pt. både har fået antibiotika og en diagnose samme dag, tæller det kun med som et event. Det samme gør sig gældende hvis pt. både har fået antibiotika og en tabl. Kur prednisolon ordineret samme dag. Praksis kan altid se i patientbaggrund i formularen, hvor mange event vi kan se i data, men vær opmærksom på, at det ikke altid summer op til det beregnede antal exacerbationer, hvis nogen af events falder samme dag.

Eksempel på to ”events” i formularen, men hvor der ”kun” er beregnet en exacerbation, da de er registreret samme dag.

Seneste værdi

FEV13.5L

FVC5.2L

FEV1 i % (hentet)110%

Lungefunktion us. Vælg

Vægt68kg

Højde1.72m

BMI23kg/m²

RygestatusDagligt

Risiko for Osteoporose

CAT14Date: 15-12-2023

MRC grad2: Andenød ved has

Eksacerbationer (beregnet)1

KOL indlæggelse inden for 12 mdr.

Eosinofili10⁹/L

α1-antitrypsin

Henvist til rehabiliteringGlem at spørge

GOLD StatusB(beregnet)

Behandlingsanbefalinger

Nyeste ord. dato	Anbefalet
LABA	✓
LAMA	✓
ICS	⚠

✓ Anbefales

⚠ Anbefales måske

⚠ Anbefales ikke

🔍 Årsag for anbefaling

Patientbaggrund

Patienten har 1 gang fået diagnosen akut bronkit/bronkiolet (ICPC: R78) indenfor de sidste 12 måneder.

Patienten har 1 gang fået diagnosen lungebetændelse (ICPC: R74) indenfor de sidste 12 måneder.

Markering af en LDL værdi, der har været for høj i diabetes formularen


I diabetes formularen har vi indsæt et rødt udråbstegn ved LDL målingen, hvis der har været en værdi, som var > 5.0 (eller > 4.0 i alderen 18-40) eller hvis pt. allerede har en diagnose for familiær hyperkolesterolæmi. De røde udråbstegn ses allerede i patientlisterne for diabetes, hypertension, hyperkolesterolæmi og IHS, hvis pt. har sådan en LDL måling og det er dermed overført visuelt til diabetes formularen.

Seneste værdi ?

Rygestatus	Lejlighedsvis	Patienten har haft en LDL måling mellem 4 og 5 i alderen 18-40 år og er i risiko for familier hyperkolesterolæmi
Højde	1.35 m	LDL Kolesterol ! mmol/L
Vægt	78 kg	LDL % Fald %

Graf over patienter, som får diabetes medicin uden de har en diabetes diagnose registreret

I hypertensions, IHS og hyperkolesterolæmi overblik grafer – under faneblad for "HbA1c" - kan ses en graf, der nu viser de patienter, som får diabetes medicin ordineret, men en indikationskode tilhæftet, som enten er "31=mod sukkersyge", "415=behandling af type 2 diabetes" eller "751=behandling af type 1 diabetes". Vær opmærksom på at patient fx godt kan få en SGLT2 pga. hjertesvigt eller nedsat nyrefunktion sammen med IHS, uden at have en reel diabetes diagnose. De vil fremgå af denne graf. Grafen kan – sammen med grafen over HbA1c niveau > 48 – bruges til at fremsøge patienter, som behandles for diabetes eller har diabetes ud fra HbA1c uden at have en diabetes diagnose registreret i praksis system.




Ozempic seponeret og HbA1c graf

I diabetes overblik – under faneblad for HbA1c er der kommet en ny graf, som hedder "Ozempic seponeret og HbA1c" graf.

Heri kan ses patienter, som har fået Ozempic, men hvor det aktuelt er seponeret (seponeret i perioden fra 1.jan 2024 frem til dags dato). I grafen kan disse patienters HbA1c følges.

Ozempic/Rybelsus/Trulicity ændrede tilskudsstatus i oktober 2024, hvorfor flere diabetes patienter har skiftet antidiabetisk behandling. Et behandlingsskifte kan medføre en periode, hvor HbA1c niveauet bliver påvirket og den nye medicinske behandling skal justeres ind ift. dosis for et velreguleret HbA1c, derfor kan det være relevant at fremsøge disse patienter her i denne graf.



Små rettelser:

Vi har KOL formularen indsat Handelsnavn på den gruppe af medicin, som en KOL patient behandles med, så man kan se, hvilken LABA, LAMA og/eller ICS vi anvender fra ordinationen. Således vil navnet på selve præparatet kunne ses, ved at holde musen på "R" symbolet:

GOLD Status 1

E

(beregnet)

Info om GOLD E

Behandlingsanbefalinger 2

	Nyeste ord. dato	Anbefalet
LABA ®	22-05-2019	✓
LAMA ®	22-05-2019	✓
ICS ®	22-05-2019	✓

Handelsnavn

AeroBec®

Når vi viser klyngemålepunkter i forløbsplanen henter vi data fra kronikerdatabasen for alle projekter. Det er mest en teknisk oplysning og alle visninger og beregninger skulle gerne være som hidtil.